

TAMIFLU[®] (OSELTAMIVIR)
til børn på 1 år og derover

*Fremstilling af opløsning ud fra
Tamiflu 75 mg kapsler*

HVIS TAMIFLU ORAL SUSPENSION IKKE KAN SKAFFES

I situationer, hvor fabriksfremstillet Tamiflu oral suspension ikke er tilgængelig, kan voksne, unge og børn, som ikke kan sluge kapsler, få den rette dosis Tamiflu ud fra en 75 mg kapsel. Nedenfor er en vejledning i tilberedning af den rette dosis.

DOSERING AF TAMIFLU TIL BØRN PÅ 1 ÅR OG ÆLDRE

Dosis fremgår af nedenstående skema. Du skal bruge barnets vægt til at bestemme den rigtige dosis af Tamiflu opløsning.

Til højre i skemaet kan du se, hvor mange ml opløsning, du skal give dit barn ud af de 5 ml, du skal blande.

Tilbered og giv kun 1 dosis ad gangen.

Legemsvægt	Dosis Tamiflu opløsning
Op til 15 kg	2 ml = 1 dosis
Over 15 kg op til 23 kg	3 ml = 1 dosis
Over 23 kg op til 40 kg	4 ml = 1 dosis
Over 40 kg	5 ml = 1 dosis

Tamiflu bør gives sammen med lidt mad.

For at dosere Tamiflu er det nødvendigt at åbne en Tamiflu 75 mg kapsel og blande indholdet fra kapslen med vand.

Du skal bruge:

- 1 Tamiflu 75 mg kapsel
- 1 stk. 5 ml sprøjte (kan købes på apoteket)
- 2 små skåle
- 1 teske
- 1 teskefuld sød fødevarer
- 5 ml rent vand, gerne fra vandhanen

Forslag til søde fødevarer, der kan "skjule" den bitre smag af Tamiflu kan være yoghurt, æblemos, saftvand, sukkervand, chokoladesirup, kirsebærsirup, dessertsauce (som f.eks. karamelsauce) eller noget andet sødt, som dit barn kan lide.

TILBEREDNING AF TAMIFLU OPLØSNINGEN

1. Hold kapslen over den ene skål og åben forsigtigt kapslen ved at trække de to dele, kapslen består af, fra hinanden, og kom indholdet i skålen. Du kan også klippe toppen af kapslen med en ren saks. Undgå at få pulveret på huden eller i øjnene, da det kan virke lidt irriterende
2. Med sprøjten afmåles 5 ml vand, som kommes i skålen med pulveret, og der røres i ca. 2 minutter. Der vil være lidt hvidt pulver, som ikke kan opløses. Dette er ikke virksomt lægemiddel, og behøver ikke at blive opløst
3. Træk den mængde opløsning op i sprøjten, som svarer til den dosis, barnet skal have (check den korrekte mængde i skemaet ovenfor). Det hvide pulver behøver ikke at blive trukket op i sprøjten
4. Tag nu den anden skål frem og kom 1 teskefuld af en af de førnævnte søde fødevarer i skålen. Tøm sprøjstens indhold ned i skålen og bland grundigt
5. Blandingen gives til dit barn/patienten. Det er vigtigt, at hele den afmålte dosis gives. Hvis noget af blandingen er tilbage i skålen, skal du skylle med lidt vand og lade patienten drikke resten af indholdet
6. Smid en eventuel rest af opløsningen ud og skyl sprøjten med vand. En eventuel rest ikke må anvendes senere

HVOR OFTE SKAL TAMIFLU OPLØSNING GIVES?

- Ved behandling af influenza skal dit barn have 1 dosis 2 gange dagligt i 5 dage
- Ved forebyggelse af influenza skal dit barn have 1 dosis én gang dagligt i 10 dage

HVORNÅR SKAL TAMIFLU GIVES?

Det er din læge som afgør, om dit barn skal have TAMIFLU, og om det skal gives som behandling eller forebyggende.

TAMIFLU anvendes som behandling, hvis dit barn har influenzasymptomer. Behandling bør senest startes 48 timer efter de første symptomer startede.

TAMIFLU anvendes forebyggende, hvis der er influenza i hjemmet, men dit barn ingen symptomer har på influenza. Hvis dit barn udvikler influenzasymptomer skifter du til behandling – se ovenfor.