

TAMIFLU[®] (oseltamivir)
til børn over 1 år

*Vejledning til opblanding af
Tamiflu 30, 45, 60 eller 75 mg doser i
fødevarer*

HVIS TAMIFLU ORAL SUSPENSION IKKE KAN SKAFFES

I situationer, hvor fabriksfremstillet Tamiflu oral suspension ikke er tilgængelig, kan voksne, unge og børn, som ikke kan sluge kapsler, få den rette dosis Tamiflu ved at åbne kapslerne og hælde indholdet ud i en passende lille mængde (højest 1 teskefuld) sød fødevarer.

EKSEMPLER PÅ SØDE FØDEVARER

Sukkervand, chokoladesirup, kirsebærsirup og dessertsauce (som f.eks. karamelsauce).

Dette vil maskere den bitre smag. Blandingen bør omrøres og gives til patienten. Hele blandingen bør sluges straks efter opblanding.

KLARGØRING AF TAMIFLU DOSIS

Tamiflu doseres efter barnets vægt. I nedenstående tabel kan man aflæse legemsvægten til venstre, i midten fremgår det, hvilken dosis af Tamiflu der skal anvendes og til højre, hvor mange kapsler man skal bruge, for at fremstille 1 dosis. Disse doser gælder for børn, som er 1 år og ældre.

Legemsvægt	Anbefalet dosis i 5 dage	Antal kapsler til 1 dosis
Op til 15 kg	30 mg to gange daglig	1 stk. 30 mg kapsel
Over 15 kg op til 23 kg	45 mg to gange daglig	1 stk. 45 mg kapsel
Over 23 kg op til 40 kg	60 mg to gange daglig	2 stk. 30 mg kapsler
Over 40 kg	75 mg to gange daglig	1 stk. 75 mg kapsel

1. Tag det antal kapsler, som du skal bruge.
2. Åben forsigtigt en kapsel ved at trække de to dele, kapslen består af, fra hinanden, og kom indholdet i en lille skål. Undgå at få pulveret på huden eller i øjnene, da det kan virke lidt irriterende
3. Tilsæt derefter den søde fødevarer (højest 1 testefuld) og omrør.
4. Hele blandingen gives til patienten straks.

Tamiflu bør gives sammen med lidt mad.

HVOR OFTE SKAL TAMIFLU GIVES?

- Ved behandling af influenza skal dit barn have 1 dosis 2 gange dagligt i 5 dage
- Ved forebyggelse af influenza skal dit barn have 1 dosis én gang dagligt i 10 dage

HVORNÅR SKAL TAMIFLU GIVES?

Det er din læge som afgør, om dit barn skal have TAMIFLU, og om det skal gives som behandling eller forebyggende.

TAMIFLU anvendes som behandling, hvis dit barn har influenzasymptomer. Behandling bør senest startes 48 timer efter de første symptomer startede.

TAMIFLU anvendes forebyggende, hvis der er influenza i hjemmet, men dit barn ingen symptomer har på influenza. Hvis dit barn udvikler influenzasymptomer skifter du til behandling – se ovenfor.