

Dosering af Tamiflu® (oseltamivir) til behandling af børn

Tamiflu doseringsskema for børn over 1 år

Legemsvægt	Anbefalet daglig dosis i 5 dage	Antal Tamiflu kapsler
Op til 15 kg	30 mg 2 gange daglig	1 stk. 30 mg kapsel 2 gange dagligt
Over 15 kg op til 23 kg	45 mg 2 gange daglig	1 stk. 45 mg kapsel 2 gange dagligt
Over 23 kg op til 40 kg	60 mg 2 gange daglig	2 stk. 30 mg kapsler 2 gange dagligt
Over 40 kg	75 mg 2 gange daglig	1 stk. 75 mg kapsel 2 gange dagligt

Tamiflu opløsning kan fremstilles ud fra 30, 45 og 75 mg kapsler i tilfælde, hvor Tamiflu oral suspension 12 mg/ml ikke er tilgængelig

Tamiflu doseringsskema for spædbørn i alderen 1 til 12 måneder:

Vægt (afrundet til nærmeste 0,5 kg)	Anbefalet daglig dosis i 5 dage	Mængde af Tamiflu opløsning
4 kg	10 mg 2 gange daglig	1,00 ml 2 gange dagligt
4,5 kg	11,25 mg 2 gange daglig	1,10 ml 2 gange dagligt
5 kg	12,5 mg 2 gange daglig	1,30 ml 2 gange dagligt
5,5 kg	13,75 mg 2 gange daglig	1,40 ml 2 gange dagligt
6 kg	15 mg 2 gange daglig	1,50 ml 2 gange dagligt
7 kg	21 mg 2 gange daglig	2,10 ml 2 gange dagligt
8 kg	24 mg 2 gange daglig	2,40 ml 2 gange dagligt
9 kg	27 mg 2 gange daglig	2,70 ml 2 gange dagligt
≥ 10 kg	30 mg 2 gange daglig	3,00 ml 2 gange dagligt

Tamiflu doseringsskema for spædbørn, som er yngre end 1 måned:

Vægt (afrundet til nærmeste 0,5 kg)	Anbefalet daglig dosis i 5 dage	Mængde af Tamiflu opløsning
3 kg	6 mg 2 gange daglig	0,60 ml 2 gange dagligt
3,5 kg	7 mg 2 gange daglig	0,70 ml 2 gange dagligt
4 kg	8 mg 2 gange daglig	0,80 ml 2 gange dagligt
4,5 kg	9 mg 2 gange daglig	0,90 ml 2 gange dagligt

Denne doseringsvejledning glæder IKKE for fabriksfremstillet
TAMIFLU ORAL SUSPENSION 12 MG/ML